

# Rote Liste der Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens, 6. Fassung, Stand: Juni 2016<sup>1</sup> (Kurzübersicht)

Herausgegeben von der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft (NWO)  
und dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV)

Christoph Grüneberg, Stefan R. Sudmann, Frank Herhaus, Peter Herkenrath, Michael M. Jöbges, Heinrich König, Klaus Nottmeyer, Kathrin Schidelko, Michael Schmitz, Werner Schubert, Darius Stiels & Joachim Weiss

**Originalpublikation erschienen in:**  
Charadrius 52, Heft 1-2, 2016 (2017): 1–66

<sup>1</sup> Die Druckfassung erschien im November 2017

Deutscher Name	Wissenschaftl. Name	Status	Bestand	HK	LT	KT	RF	RLb 2016	S	RLb 2008
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	I	750-950	s	>	=		*		*
Schwarzschan	<i>Cygnus atratus</i>	IIIa								
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	IIIa								
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	I	70	ss	ne	↑		*		R
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	IIIa								
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	IIIb								
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	II								
Graugans	<i>Anser anser</i>	I		mh	>	↑		*		*
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	IIIa								
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	I	150-220	s	ne	↑		*		*
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	IIIa								
Brautente	<i>Aix sponsa</i>	IIIa								
Mandarintente	<i>Aix galericulata</i>	IIIa								
Rotschulterente	<i>Callonetta leucophrys</i>	IIIb								
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	I	270-470	s	ne	↑		*		*
Krickente	<i>Anas crecca</i>	I	120-180	s	(<)	=		3	S	3
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	I		h	(<)	=		*		*
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	I	45-75	ss	(<)	=	N	1	S	1
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	I	70-120	ss	=	=	N	3	S	2
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	I	3-4	es	ne	↑		R		
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	I	35-50	ss	ne	↓↓↓		1		3
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	I		mh	ne	↑		*		*
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	II								
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	II								

Deutscher Name	Wissenschaftl. Name	Status	Bestand	HK	LT	KT	RF	RLb 2016	S	RLb 2008
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	I	3-5	es	ne	↑		R		
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	I	400-2.000	mh	(<)	↓↓	I	2		2
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	IIIa								
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	I		mh	(<)	↓↓↓		2	S	2
Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	I	15-25	es	(<)	↓↓↓		1	S	1
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	I ex.		ex				0		0
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	I ex.		ex				0		0
Truthuhn	<i>Meleagris gallopavo</i>	IIIb								
Kubaflamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>	IIIb								
Rosaflamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	IIIa								
Chileflamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	IIIa								
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	I		mh	=	↑		*		*
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	I		mh	>	↑		*		*
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	II								R
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	I	5	es	ne	↑		R		R
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	I	1.100	mh	ne	↑		*		*
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	I ex		ex				0		0
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	I	1-2	es	(<)	=		1		1
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	I	2.000-2.200	mh	>	↑		*		*
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	I	100-120	s	>	↑	D	*	S	3
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	I	200	s	>	↑		*	S	3
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	I ex		ex				0		0
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	I	300-500	s	(<)	↓↓		2		2
Kornweihe	<i>Circus pygargus</i>	I ex	0-1	ex				0		0
Wiesenweihe	<i>Circus cyaneus</i>	I	20	es	(<)	↓↓↓		1	S	1
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	I	160-180	s	(<)	↑		V	S	3
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	I		mh	(<)	↓↓		3		V
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	I		mh	=	=		*		*
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	I	920-980	s	>	=	D	*	S	3
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	I	80-100	ss	>	↑		*		R
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	I		mh	=	↑		*		*
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	I	400-600	s	(<)	=		3		3
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	I	220	s	>	↑		*	S	*
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	I		mh	(<)	=		V		V

Deutscher Name	Wissenschaftl. Name	Status	Bestand	HK	LT	KT	RF	RLb 2016	S	RLb 2008
Kranich	<i>Grus grus</i>	I	7	es	ne	↑		R	S	
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	I	200-600	s	(<)	=		3		3
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	I	30-50	ss	(<)	↓↓		1	S	1
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	I	2-3	es	(<)	=		1		1
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	I ex		ex				0		0
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	I		mh	(<)	=		V		V
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	I		mh	>	↑		*		*
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	I	400-600	s	ne	↑		*		*
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	II								
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	II								
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	I ex		ex				0		0
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	I		mh	(<)	↓↓↓		2	S	3
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	I	500-750	s	(<)	↓↓		2		3
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	I ex		ex				0		0
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	III b								
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	I	660	s	(<)	↑	I, N, uR	3	S	2
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	I	150	s	(<)	↓↓↓		1	S	1
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	I		mh	(<)	↓↓		3		3
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	I ex		ex				0		0
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	I	30-35	ss	(<)	↓↓↓		1	S	1
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	I ex		ex				0		0
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	I	40-60	ss	(<)	=	I, N	1	S	1
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	I ex		ex				0		0
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	I ex		ex				0		0
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	I ex		ex				0		0
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	I	6.000	mh	>	↓↓↓		*		*
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	I	5-10	es	ne	↑		R		R
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	I	400-450	s	ne	↑		*		*
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	I	50-60	es	ne	↑		R		R
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	I	10-30	es	ne	↑		R		R
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	I	100-130	s	ne	↑		*		R
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	I ex		ex				0		0
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	I	40-44	es	(<)	↑	F, N	1	S	1
Flusseeeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	I	150-170	s	(<)	↑	N	3	S	3
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	IIIa								

Deutscher Name	Wissenschaftl. Name	Status	Bestand	HK	LT	KT	RF	RLb 2016	S	RLb 2008
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	I		mh	>	↑		*		*
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	I		h	>	=		*		*
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	I		h	ne	↓↓		V		*
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	I		mh	(<)	↓↓↓		2		2
Alexandersittich	<i>Psittacula eupatria</i>	IIIa								
Halsbandsittich	<i>Psittacula krameri</i>	IIIa								
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	I		mh	(<)	↓↓↓		2		3
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	I		mh	(<)	↑		*	S	*
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	I	50-90	ss	ne	↓↓	uR	1	S	R
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	I		mh	(<)	=	D, N	3	S	3
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	I	140-180	s	ne	↑		*		R
Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	II								
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	I		mh	(<)	↓↓		3		3
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	I ex	0-2	ex				0		0
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	I	500-550	s	>	↑		*		*
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	I		mh	=	=		*		*
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	I	250	s	(<)	↓↓		2	S	1
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	I		h	=	=		*		*
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	I ex		ex				0		0
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	I		mh	(<)	↑		*		*
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	I	<10	es	ne	↑		R	S	R
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	I ex		ex				0		0
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	I	20	ss	(<)	↓↓↓		1	S	1
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	I	650-1.000	s	(<)	↓↓		2		2
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	I		mh	=	↑		*		*
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	I		mh	>	=		*		*
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	I		h	>	=		*		*
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	I		mh	=	↑		*		V
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	I		mh	(<)	↓↓		3		3
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	I	400-600	s	(<)	↓↓↓		1		1
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	I ex		ex				0		0
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	I ex		ex				0		0
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	I		mh	(<)	=		V		V
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	I	30-50	ss	(<)	↓↓↓		1		1

Deutscher Name	Wissenschaftl. Name	Status	Bestand	HK	LT	KT	RF	RLb 2016	S	RLb 2008
Elster	<i>Pica pica</i>	I		h	=	↓↓		*		*
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	I		h	=	↑		*		*
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	I	320-480	s	>	=		*		*
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	I		h	=	↑		*		*
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	I	12.700-12.800	h	(<)	↑		*		*
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	I		h	>	↑		*		*
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	I	400-450	s	>	↑		*		V
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	I	<30	ss	ne	↓↓↓		1		R
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	I		h	>	↑		*		*
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	I		h	>	=		*		*
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	I		h	>	↑		*		*
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	I		h	>	=		*		*
Sumpfmehse	<i>Parus palustris</i>	I		h	=	=		*		*
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	I		h	=	↓↓↓		*		*
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	I ex		ex				0		1
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	I		mh	(<)	↑		*	S	3
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	I		h	(<)	↓↓↓		3	S	3
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	I		mh	(<)	↓↓	I	2	S	V
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	I		h	(<)	↓↓↓		3		3
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	I		h	(<)	↓↓↓		3	S	3
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	I	4-6	es	ne	=		R		R
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	I		h	=	=		*		*
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	I		mh	(<)	↓↓		3		3
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	I		h	(<)	↓↓		V		V
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	I		h	>	↑		*		*
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	I		mh	(<)	↓↓		3		3
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	IV								
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	I	2	es	=	=		R		R
Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	I ex		ex				0		0
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	I	5-10	es	(<)	↓↓		1		1
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	I		h	(<)	↓↓		V		*
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	I		mh	(<)	↑		*		*
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	I	3-5	es	(<)	=		1		1
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	I		mh	=	↓↓		*		V

Deutscher Name	Wissenschaftl. Name	Status	Bestand	HK	LT	KT	RF	RLb 2016	S	RLb 2008
Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i>	I	10-15	es	ne	↑		R		R
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	I		h	>	↑		*		*
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	I		h	=	=		*		*
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	II								
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	I		h	(<)	↓↓		V		V
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	I		h	(<)	↑		*		*
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	I		h	>	=		*		*
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	I		h	>	=		*		*
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	I		h	>	=		*		*
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	I		h	>	↑		*		*
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	I		h	=	=		*		*
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	I		h	>	↑		*		*
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	I		h	(<)	↓↓	I	3		V
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	I		mh	=	=		*		*
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	I		h	>	=		*		*
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	II								R
Amsel	<i>Turdus merula</i>	I		h	>	=		*		*
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	I		h	ne	↓↓		V		*
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	I		h	>	=		*		*
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	I		h	=	↓↓		*		*
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	II								
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	I		mh	>	↓↓		*		*
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	I ex		ex				0		0
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	I	200-250	s	(<)	↓↓↓		1	S	1
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	I		mh	(<)	↑		*		3
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	I		h	>	=		*		*
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	I		mh	(<)	↓↓		3		3
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	I	150	s	(<)	↑	N, (F,M)	3		2
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	I		h	>	=		*		*
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	I		mh	(<)	↓↓↓		2		2
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	I	10-20	es	(<)	↓↓↓		1		1
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	I		h	>	=		*		*
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	I		h	(<)	↓↓		V		V
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	I		h	(<)	↓↓↓		3		3

Deutscher Name	Wissenschaftl. Name	Status	Bestand	HK	LT	KT	RF	RLb 2016	S	RLb 2008
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	I ex		ex				0		0
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	I		mh	(<)	↓↓↓		2		3
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	I		mh	(<)	↓↓↓		2	S	2
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	I		mh	>	=		*		*
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	I		mh	=	↑		*		*
Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flavissima</i>	II								
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	I		h	(<)	↓↓		V		V
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	I		h	>	=		*		*
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	I		h	=	=		*		*
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	I		h	=	↓↓		*		V
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	II								
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	I		mh	ne	↓↓↓		2		*
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	I	500-2.000	s	>	=		*		*
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	I		h	>	↑		*		*
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	I		h	=	↑		*		*
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	I	250-750	s	>	=		*		*
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	I		h	(<)	↓↓↓		3		V
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	I		mh	ne	=		*		*
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>	I	150	s	(<)	↓↓↓		1	S	1
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	I		h	(<)	=		*		V
Zaunammer	<i>Emberiza cirlus</i>	I	1	es	(<)	=		1		0
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	I	10	es	>	↑		R		R
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	I ex		ex				0		1
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	I		mh	(<)	=		V		V

Ausführliche zitierbare Originalversion inklusive Erklärung der Abkürzungen frei online (pdf) verfügbar oder als Druckversion bestellbar auf:

<http://nw-ornithologen.de/index.php/publikationen/rote-listen>